

Dabigatran etexilate STADA® Nordic kapselit dabigatraanieteksilaa

- Tämän kortin on oltava aina potilaan tai potilasta hoitavan henkilön mukana
- Varmista, että käytössäsi on viimeisin versio

Hyvä potilas / lapsipotilasta hoitava henkilö,

lääkärisi / lastasi hoitava lääkäri on aloittanut sinulle/ lapsellesi Dabigatran etexilate Stada Nordic -hoidon. Tutustu pakkausselosteessa oleviin tärkeisiin ohjeisiin Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien turvallisen käytön varmistamiseksi.

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää tietoa lääkehoidostasi / lapsesi lääkehoidosta. Pidä sitä aina mukanasasi / lapsesi mukana, jotta terveydenhuollon ammattilaiset tietävät sinun/lapsesi käyttävän Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapseleita.

Tietoa Dabigatran etexilate Stada Nordic -valmisteen potilaille / lapsipotilaita hoitaville henkilöille

Tietoa lääkehoidostasi / lapsesi lääkehoidosta

- Dabigatran etexilate Stada Nordic ohentaa verta. Sitä käytetään veritulppien hoitoon tai ehkäisemään vaarallisten veritulppien muodostumista.
- Seuraa lääkärisi / lastasi hoitavan lääkärin ohjeita, kun käytät Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapseleita. Älä koskaan jätä annoksia ottamatta tai lopeta Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien käyttöä keskustelematta lääkärisi / lastasi hoitavan lääkärin kanssa.
- Kerro lääkärillesi / lastasi hoitavalle lääkärille kaikista lääkkeistä, joita parhaillaan käytät / joita lapsesi parhaillaan käyttää.
- Kerro lääkärillesi / lastasi hoitavalle lääkärille Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien käytöstä ennen mitään kirurgisia tai elimistön sisälle ulottuvia toimenpiteitä.
- Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman. Kapseli niellään kokonaisena vesilasillisen kera. Kapseli ei saa rikkua tai pureskella, eikä sen sisältöä saa tyhjentää.

Milloin on syytä hakeutua lääkäriin

- Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien käyttö voi suurentaa verenvuotoriskiä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin / lastasi hoitavaan lääkäriin, jos havaitset itselläsi / lapsellasi seuraavia mahdollisia verenvuodon merkkejä ja oireita: turvotus, epämuodokas olo, epätavallinen kipu tai päänsärky, huimaus, kalpeus, heikotus, epätavallinen mustelmien muodostus, verenvuoto nenästä, verenvuoto ikenistä, epätavallisen pitkään kestävä verenvuoto haavoista, poikkeava kuukautisvuoto tai verenvuoto emättimestä, veren esiintyminen virtsassa, mikä värjää virtsan vaaleanpunaiseksi tai ruskeaksi, punertavat/ mustat ulosteet, veren yskiminen, verta sisältävä tai kahvinpurjua muistuttava oksennus.
- Kaatumisen tai loukkaantumisen yhteydessä, varsinkin jos lyöt pääsi tai lapsesi lyö päänsä, ota kiireellisesti yhteyttä lääkäriin.
- Älä lopeta Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien käyttöä keskustelematta lääkärisi / lastasi hoitavan lääkärin kanssa, jos sinulla / lapsellasi esiintyy närästystä, pahoinvointia, oksentelua, vatsavaivoja, vatsan turvotusta tai ylivätsäkipuja.

Tietoa Dabigatran etexilate Stada Nordic -valmisteen terveydenhuollon ammattilaisille

- Dabigatran etexilate Stada Nordic on suun kautta otettava antikoagulantti (suora trombiinin estäjä).
- Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien käyttö on ehkä keskeytettävä ennen kirurgisia tai invasiivisia toimenpiteitä.
- Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien käyttö on lopetettava välittömästi, jos esiintyy merkittävää verenvuotoa.
- Spesifinen vastalääke (idarutsimabi) on saatavilla aikuispotilaille. Spesifisen vastalääkkeen, idarutsimabin, tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu pediatrisilla potilailla. Tarkempia tietoja ja lisäohjeita Dabigatran etexilate Stada Nordic -kapselien anti-koagulaatiovaikutuksen kumoamisesta, ks. Dabigatran etexilate Stada Nordic -valmisteen ja idarutsimabin valmisteyhteenvedot.
- Dabigatran etexilate Stada Nordic eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta; riittävää diureesia on ylläpidettävä. Dabigatran etexilate Stada Nordic on dialysoitavissa.

Täytä tämä osio tai pyydä lääkäriäsi / lastasi hoitavaa lääkärää täyttämään se.

Potilastiedot

Potilaan nimi

Syntymäaika

Käyttöaihe

Dabigatran etexilate Stada Nordic -annos

0000000
2312
FI