

Lisätietoja ja kysymyksiä:

Tutustu pakkausselosteeseen Fingolimod Medical Valleyn turvallisesta käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tämän oppaan sisällöstä, olethan yhteydessä hoitavaan lääkäriisi.

Raskauden- ja imetyksenaikaiseen käyttöön liittyvistä riskeistä voi tiedustella HUSLAB:n Teratologisesta tietopalvelusta.

Puh. (09) 4717 6500

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,

PL 55, 00034 FIMEA.

www.fimea.fi

Fingolimod Medical Valley

(fingolimodi):

Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti

Riskienminimointimateriaali v. 2.0
Fimean hyväksymä 11/2025

Vasta-aihe

MIKÄLI FINGOLIMODIA KÄYTETÄÄN RASKAUDEN AIKANA, SE VOI VAHINGOITTAA SIKIÖTÄ.

Fingolimodi on vasta-aiheinen raskauden aikana ja naisilla, jotka voivat tulla raskaaksi mutta eivät käytä tehokasta ehkäisyä.

On tärkeää, että käytät tehokasta ehkäisyä fingolimodihoidon aikana sekä 2 kuukauden ajan hoidon päättymisestä jotta välttyt raskaaksi tulemiselta. Lääkärisi neuvoo sinua tehokkaimmista ehkäisyvaihtoehdoista.

Ennen fingolimodihoidon aloittamista

Fingolimodi on teratogeeninen (lääkeaine, joka aiheuttaa epämuodostumia sikiön raskaudenaikaisen altistumisen jälkeen).

Ennen kuin aloitat fingolimodihoidon ja säännöllisesti tämän jälkeen, lääkärisi kertoo sinulle hoidon teratogeenisuusriskistä ja tarvittavista toimenpiteistä riskin minimoimiseksi.

Ennen hoidon aloittamista on tehtävä raskaustesti, ja lääkärin on varmistettava negatiivinen tulos.

Lääkärisi kertoo sinulle tehokkaan ehkäisyyn tarpeesta hoidon aikana ja vielä 2 kuukauden ajan lopettamisen jälkeen.

Keskustele lääkärisi kanssa tehokkaimmista ehkäisyvaihtoehdoista.

Lue fingolimodihoitoa koskeva potilaan opas, jonka saat lääkäriltäsi.

Fingolimodihoidon aikana

Naiset eivät saa tulla raskaaksi hoidon aikana, eikä vielä 2 kuukauden aikana hoidon päättymisen jälkeenkään.

Naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä fingolimodihoidon aikana sekä 2 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen.

Raskaustesti on toistettava sopivin väliajoin.

Lääkärisi antaa neuvontaa ennen hoidon aloittamista sekä säännöllisesti sen jälkeen fingolimodin sikiöön kohdistuvasta vakavasta riskistä ja tarvittavista toimenpiteistä riskin minimoimiseksi.

Jos tulet raskaaksi tai jos haluat tulla raskaaksi fingolimodihoito **on lopetettava**.

Ilmoita lääkärillesi **välittömästi** jos epäilet olevasi raskaana. Lääkärisi antaa sinulle lääketieteellistä neuvontaa sekä arvion raskauden lopputuloksesta.

Fingolimodihoidon lopettamisen jälkeen

Kun olet lopettanut fingolimodihoidon raskauden vuoksi, **ilmoita heti lääkärillesi**, jos epäilet, että MS-tautisi pahenee (esim. heikotuksen tunne tai näköhäiriöt) tai huomaat uusia oireita.

Tehokas ehkäisy on tarpeen vielä 2 kuukauden ajan lopettamisen jälkeen, koska fingolimodin poistuminen elimistöstä kestää näin pitkään.