

Tilläggsinformation och frågor

Läs bipacksedeln för tilläggsinformation om säker användning av fingolimod.

Tala med din läkare ifall du har frågor angående informationen i denna broschyr.

RAPPORTERING AV BIVERKNINGAR

Rapportera alla biverkningar som misstänks bero på Fingolimod Medical Valley till FIMEA, via:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Register över läkemedelsbiverkningar, PB 55, 00034 FIMEA.
www.fimea.fi

KONTAKTUPPGIFTER

För information, frågor om och beställning av riskhanteringsmaterial för Fingolimod Medical Valley, kontakta Medical Valley via
safety@medicalvalley.se

Fingolimod Medical Valley

(fingolimod)

Graviditetsspecifikt patientpåminnelsekort

version 2.0/11/2025

Kontraindikation

FINGOLIMOD KAN SKADA FOSTRET IFALL DET ANVÄNDS UNDER GRAVIDITET.

Fingolimod bör inte användas av gravida kvinnor samt av kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiva preventivmetoder.

Det är viktigt att du använder effektiva preventivmetoder då du tar fingolimod samt i 2 månaders tid efter att du slutat fingolimod- behandlingen för att undvika graviditet. Din läkare ger dig information om effektiva preventivmetoder.

Innan behandling med fingolimod påbörjas

Fingolimod är ett teratogent ämne (ett ämne som förorsakar missbildningar efter fostrets exponering under graviditet). Din läkare kommer att ge information före behandlingsstarten och regelbundet därefter om den teratogena risken med fingolimod och de åtgärder som krävs för att minimera denna risk. Ett graviditetstest måste utföras och negativa resultat kontrolleras av din läkare innan behandlingen påbörjas.

Din läkare kommer att informera dig om behovet av en effektiv preventivmetod medan du tar fingolimod och i 2 månader efter att du slutat ta det. Tala med din läkare om tillförlitliga preventivmetoder.

Läs fingolimod patientbroshyren som du får av din läkare.

Medan du tar fingolimod

Patienter måste använda effektivt preventivmedel under behandling med fingolimod samt 2 månader efter avslutad behandling.

Ett graviditetstest måste upprepas med lämpliga intervaller.

Din läkare informerar dig om de allvarliga risker för fostret som fingolimod kan utgöra och om de åtgärder som krävs för att minimera risken före behandlingen påbörjas samt regelbundet därefter.

Om du blir eller om du vill bli gravid, tala med din läkare eftersom behandlingen med fingolimod **måste avbrytas**.

Kontakta din läkare **omgående** ifall du tror att du är gravid. Din läkare kommer att ge medicinsk rådgivning och utvärdera eventuella resultat av graviditeten

Efter avslutad behandling med fingolimod

Informera din läkare omedelbart om du tycker att din MS försämras (t.ex. svaghet eller synförändringar) eller om du märker några nya symtom efter avslutad behandling med fingolimod på grund av graviditet.

Effektiv preventivmetod behövs under 2 månader efter avslutad behandling eftersom det tar lång tid för fingolimod att försvinna ur kroppen.