

Potilaskortti

Tärkeää tietoa naispotilaille, jotka voivat tulla raskaaksi

WELIREG (beltsutifaani)

WELIREG-valmisteen käytön aikana ei saa tulla raskaaksi.

Jos olet raskaana

- älä ota WELIREG-valmistetta von Hippel–Lindaun taudin hoitoon
- keskustele lääkärin kanssa WELIREG-valmisteen käytöstä munuaiskarsinooman hoitoon.
- WELIREG saattaa vahingoittaa kohdussa olevaa lasta ja aiheuttaa keskenmenon.
- Kerro lääkärille heti, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, tulet raskaaksi tai haluat tulla raskaaksi ennen WELIREG-hoitoa tai hoidon aikana
- Lääkäri pyytää sinua tekemään raskaustestin ennen kuin aloitat WELIREG-valmisteen käytön.

Raskauden ehkäisy

- Hormoneja sisältävät ehkäisyvalmisteet – kuten ehkäisytabletit, -pistokset tai -laastarit – eivät välttämättä tehoa tavanomaiseen tapaan WELIREG-hoidon aikana.
- Käytä luotettavaa, hormonitonta ehkäisymenetelmää tai varmista, että miespuolinen kumppanisi käyttää kondomia raskauden ehkäisyyn, WELIREG-hoidon aikana ja vähintään 1 viikon ajan viimeisen annoksen ottamisen jälkeen.
- Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa siitä, mitkä ehkäisymenetelmät voisivat sopia sinulle.

Lue lisätiedot huolellisesti pakkausselosteesta.

Tärkeät yhteystiedot

Oma nimi _____

Lääkärin nimi _____

Puhelinnumero virka-aikaan _____

