

Patientkort

Viktig information för kvinnliga patienter som kan bli gravida

WELIREG (belzutifan)

Du ska inte bli gravid medan du tar WELIREG.

Om du är gravid:

- Ta inte WELIREG för von Hippel-Lindaus sjukdom.
 - Prata med din läkare om användning av WELIREG för behandling av njurcellscancer.
- WELIREG kan skada fostret i livmodern och orsaka missfall.
- Prata omedelbart med din läkare om du är gravid, tror att du är gravid, blir gravid eller om du vill bli gravid, före och under behandling med WELIREG.
- Du kommer att få göra ett graviditetstest innan du börjar ta WELIREG.

Preventivmedel

- Preventivmedel som innehåller hormoner, såsom p-piller, p-sprutor eller p-plåster kan fungera sämre medan du tar WELIREG.
- Använd en tillförlitlig preventivmetod utan hormoner, eller se till att din manliga partner använder kondom för att förhindra graviditet. Gör detta medan du tar WELIREG och i minst en vecka efter din sista dos.
- Prata med din läkare eller apotekspersonal om preventivmedel som kan passa för dig.

Läs bipacksedeln noggrant för mer information.

Viktig kontaktinformation

Mitt namn _____

Min läkares namn _____

Telefon kontorstid _____

