

POTILASKORTTI

[Rivaroxaban Grindeks 10 mg / 15 mg / 20 mg kalvopäällysteiset tabletit]

- ☐ **Rivaroxaban Grindeks 10 mg** (merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)
- ☐ **Rivaroxaban Grindeks 15 mg** (merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)
- ☐ **Rivaroxaban Grindeks 20 mg** (merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)

- **Pidä tämä kortti aina mukanas**
- **Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä**

Käytän verenohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban Grindeks (rivaroksabaani).

Nimi:

Osoite:

Syntymäaika:

Paino:

Muut lääkkeet/sairaudet:

Hätätapauksissa ilmoittakaa:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelin:

Lääkärin leima:

Ilmoittakaa myös:

Nimi:

Puhelin:

Suhde potilaaseen:

Tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle:

- INR-mittausta ei pidä käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban Grindeks -valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti.

Mitä minun tulee tietää Rivaroxaban Grindeks -valmisteesta?

- Rivaroxaban Grindeks ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen.
- Ota Rivaroxaban Grindeks -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, kun **otat sinulle määrätty annokset säännöllisesti**.
- Älä lopeta Rivaroxaban Grindeks -valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.
- Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Grindeks -valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa.
- Kerro aina että käytät Rivaroxaban Grindeks -valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide.

Milloin tarvitsen lääkärin apua?

Rivaroxaban Grindeks -valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban Grindeks -valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista:

- kipua
- turvotusta tai epämukavuutta
- päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan
- tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa tai muuta verenvuotoa emättimestä
- virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia
- yskit verta taikka oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia.

Miten otan Rivaroxaban Grindeks -valmistetta?

- Parhaan suojan saamiseksi Rivaroxaban Grindeks
 - 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa
 - 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa