

Påminnelsekort

ZADENVI 60 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

(biosimilar av denosumab)

Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandlingen med denosumab.

Läkaren har rekommenderat att du ska få denosumab som används för att behandla osteoporos och motverka förlust av benmassa. Dessa sjukdomar innebär att skelettben blir tunna och sköra, vilket kan öka risken för benbrott.

En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (skelettskador i käken) har rapporterats i sällsynta fall (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare) hos patienter som får denosumab mot osteoporos. ONJ kan också uppstå då behandlingen är avslutad.

Det är viktigt att försöka förhindra ONJ från att utvecklas, eftersom det kan vara ett smärtsamt tillstånd som är svårt att behandla. För att minska risken för att utveckla ONJ ska du iaktta några försiktighetsåtgärder.

Före behandlingen:

Tala om för läkaren eller sjuksköterskan (vårdpersonal) om du har några problem med din mun eller tänder.

Läkaren kan be dig att genomgå en tandläkarundersökning om du:

- tidigare har behandlats med en bisfosfonat
- använder läkemedel som kallas kortikosteroider (som prednisolon eller dexametason)
- är rökare
- har cancer
- inte har varit på en undersökning hos tandläkaren på länge
- har problem med din mun eller tänder.

Under behandlingen:

- Du ska hålla god munhygien och gå på regelbundna tandläkarbesök. Om du använder tandprotes ska du se till att den sitter bra.
- Om du genomgår tandläkarbehandling eller ska genomgå en tandoperation (t.ex. tandutdragningar), ska du informera läkaren och berätta för tandläkaren att du behandlas med denosumab.
- Kontakta omedelbart läkare och tandläkare om du drabbas av problem med munnen eller tänderna, t.ex. lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller som utsöndrar vätska, eftersom detta kan vara tecken på ONJ.

Läs bipacksedeln som följer med läkemedlet för mer information.