

INTRAVENÖST JÄRN

Viktig information till patienter om den potentiella risken för allvarliga allergiska reaktioner i samband med intravenöst järn (ett läkemedel som administreras med en nål i en ven)

Läs denna bruksanvisning noggrant och tala med din läkare om du har några frågor.

Om du märker några biverkningar, tala om det för din läkare eller sjukskötare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna guide.

Du kan också anmäla biverkningar direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea på webbplatsen www.fimea.fi eller per post: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Register över biverkningar av läkemedel, PB 55 00034 FIMEA

Biverkningar kan också anmälas direkt till innehavaren av försäljningstillståndet per e-post infofi@viatris.com eller per telefon 020 720 9555

Utbildningsmaterial för patienter om järnkarboxymaltos (intravenöst järn)

Intravenöst järn används för att behandla järnbrist när orala preparat är ineffektiva eller inte kan användas

Intravenöst järn kan orsaka allergiska reaktioner och bör endast administreras av personer som har utbildats i att bedöma och hantera dessa reaktioner.

Hos vissa patienter kan dessa allergiska reaktioner bli allvarliga eller livshotande (så kallade anafylaktiska reaktioner) och orsaka hjärt- och blodtrycksproblem och/eller svimning eller medvetslöshet.

Du kan löpa ökad risk för en allergisk reaktion om du har:

- känd allergi inklusive läkemedelsallergier
- en historia av svår astma, utslag eller andra allergier (t.ex. damm, pollen, mjäll från husdjur) eller
- immunsjukdomar eller inflammatoriska sjukdomar (t.ex. reumatoid artrit, lupus erythematosus och andra)

Tala med din läkare innan du får eller ordineras intravenöst järn

om du har någon av dessa allergier eller tillstånd.

Din läkare kommer att avgöra om nyttan för dig är större än risken.

Du ska inte förskrivas eller ges intravenöst järn om:

- du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
- tidigare har haft allvarliga allergiska (överkänsliga) reaktioner mot andra intravenösa järnbehandlingar*
- du har järnöverskott (för mycket järn i kroppen)
- din anemi inte beror på järnbrist

Tala med din läkare innan du får eller ordineras intravenöst järn

om du har någon av dessa allergier eller medicinska tillstånd.

* Det är viktigt att veta att en reaktion kan uppstå även om du inte tidigare har haft problem med intravenöst järn.

Graviditet: intravenöst järn ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid är det viktigt att du talar med din läkare.

Kontakta omedelbart läkare eller sjukskötare om:

- du uppvisar tecken eller symtom på en allergisk reaktion under eller strax efter behandling med intravenöst järn

Till exempel: nässelutslag eller utslag, klåda, yrsel, svimning, svullnad av läppar, tunga, hals eller kropp, andningssvårigheter, andfåddhet eller väsande andning.

- Din läkare eller sjukskötare kommer att övervaka dig med avseende på tecken och symtom på en allergisk reaktion i minst 30 minuter efter varje intravenös infusionsdos av järn.