

LASKIMON- SISÄINEN RAUTA

**Tärkeää tietoa potilaille
laskimonsisäiseen rautaan
(neulalla laskimoon
annettava lääke) liittyvästä
mahdollisesta vakavien
allergisten reaktioiden
riskistä**

**Lue tämä opas huolellisesti ja
keskustele lääkärisi kanssa
mahdollisista kysymyksistäsi**



Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä oppaassa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle [www-sivustolla www.fimea.fi](http://www.sivustolla www.fimea.fi) tai postitse: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55 00034 FIMEA

Haittavaikutuksista voi ilmoittaa myös suoraan myyntiluvan haltijalle sähköpostitse infofi@viatris.com tai puhelimitse 020 720 9555

Rautakarboksi- maltoosi (laskimon- sisäinen rauta) Potilasopas

**Laskimonsisäistä rautaa
käytetään raudanpuutteen
hoitoon, kun suun kautta
otettavat valmisteet ovat
tehottomia tai niitä ei voida
käyttää.**

**Laskimonsisäinen rauta voi
aiheuttaa allergisia
reaktioita, ja sitä saavat
antaa vain henkilöt, jotka on
koulutettu arvioimaan ja
hallitsemaan näitä reaktioita.**

**Joillakin potilailla nämä
allergiset reaktiot voivat
muuttua vakaviksi tai
hengenvaarallisiksi (tunnetaan
anafylaktisina reaktioina) ja
aiheuttaa sydän- ja
verenpaineongelmia ja/tai
pyörtymisen tai tajunnan
menetyksen.**

Sinulla voi olla suurentunut allergisen reaktion riski, jos sinulla on:

- tiedossa oleva allergia, mukaan lukien lääkeaineallergiat
- sinulla on ollut vaikea astma, ihottuma tai muu allergia (esim. pöly, siitepöly, lemmikkieläinten hilse) tai
- immuuni- tai tulehdussairauksia (esim. nivelreuma, punahukka ja muut)

Kerro lääkärille ennen kuin hän määrää tai antaa sinulle laskimonsisäistä

rautaa, jos sinulla on jokin näistä allergioista tai sairauksista.

Lääkäri määrittää, onko sinulle koituva hyöty riskiä suurempi.

Sinulle ei tule määrätä tai antaa laskimonsisäistä rautaa, jos:

- olet allerginen (yliherkkä) tälle valmisteelle tai jollekin tämän valmisteen muulle aineelle
- sinulla on aiemmin ollut vakavia allergisia (yliherkkyys) reaktioita muista laskimonsisäisistä rautahoidoista*
- sinulla on raudan ylikuormitusta (liikaa rautaa kehossasi)
- anemiasi ei johdu raudanpuutteesta

Kerro lääkärillesi ennen kuin hän määrää tai antaa sinulle laskimonsisäistä

rautaan, jos sinulla on jokin näistä allergioista tai sairauksista.

* On tärkeää tietää, että reaktio voi silti tapahtua, vaikka sinulla ei olisi aiemmin ollut ongelmia laskimonsisäisen raudan kanssa.

Raskaus: laskimonsisäistä rautaa ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä. Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, on tärkeää keskustella asiasta lääkärisi kanssa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan, jos:

- sinulla on allergisen reaktion merkkejä tai oireita laskimonsisäisen rautahoidon aikana tai pian sen jälkeen

Esimerkiksi: nokkosihottuma tai ihottuma, kutina, huimaus, pyöritys, huulten, kielen, kurkun tai kehon turvotus, hengitysvaikeudet, hengenahdistus tai hengityksen vinkuminen

- Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa sinua allergisen reaktion merkkien ja oireiden varalta vähintään 30 minuutin ajan jokaisen laskimonsisäisen raudan antokerran jälkeen

Riskienminimointimateriaalia Fercarbos Potilaan opas versio 1.0 Elokuu 2025
Fimean hyväksymispäivämäärä
27. elokuuta 2025