

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhuollon ammattilaiseen. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä potilaskortissa. Voit raportoida haittavaikutukset suoraan myös osoitteeseen:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA
(www-sivusto: www.fimea.fi)

tai Pfizer Oy:lle:
www-sivusto: www.pfizersafetyreporting.com,
puh. (09) 430 040

Fimean hyväksymispäivämäärä: 11/2025
Versio 1.0

POTILAAN JA HOITAVAN LÄÄKÄRIN TIEDOT

Hoitava lääkäri täyttää potilaan tunnistetiedot, hoitoa koskevat tiedot sekä hoitavan lääkärin yhteystiedot.
Pidä tämä kortti aina mukanasasi ja näytä sitä hätätilanteessa hoitohenkilökunnalle.



Potilaan nimi: _____

Hympavzi-hoidon aloituspäivämäärä: _____

Yhteyshenkilö hätätilanteessa: _____

Yhteyshenkilön yhteystiedot
hätätilanteessa: _____

Lääkkeen määränneen lääkärin nimi: _____

Lääkkeen määränneen lääkärin
yhteystiedot: _____

POTILASKORTTI

HYMPAVZI (marstasimabi)

Pidä tämä kortti aina mukanasasi.

NÄYTÄ KORTTI jokaiselle hoitoosi osallistuvalle terveydenhuollon ammattilaiselle ja mahdollisten päivystyskäyntien yhteydessä.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA HYMPAVZI-HOITOA SAAVILLE POTILAILLE

Hympavzi (marstasimabi) on tarkoitettu verenvuotoepiso-
dien säännölliseen ennaltaehkäisevään hoitoon vähintään
12-vuotiaille potilaille, jotka painavat vähintään 35 kg ja joilla
on vaikea-asteinen A-hemofilia (synnynnäinen hyytymiste-
kijä VIII:n puutos, FVIII < 1 %) eikä ole hyytymistekijä VIII:n
vasta-aineita tai vaikea-asteinen B hemofilia (synnynnäinen
hyytymistekijä IX:n puutos, FIX < 1 %) eikä ole hyytymistekijä
IX:n vasta-aineita.

Hympavzi tehostaa veren hyytymistä. Hympavzin ja sen
kaltaisten lääkkeiden on tiedetty aiheuttaneen verisuoniin ve-
ritulppia (trombooseja). Jos veritulppa lähtee liikkeelle, se voi
kulkeutua verenkierron mukana ja aiheuttaa tukoksen toiseen
verisuoneen (tromboembolinen tapahtuma). Tromboemboli-
set tapahtumat voivat sijainnista ja vaikeusasteesta riippuen
olla henkeä uhkaavia tai johtaa kuolemaan.

POTILAALLE

LOPETA Hympavzin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä
lääkəriin, jos havaitset mahdollisen veritulpan oireita, mukaan
lukien seuraavia haittavaikutuksia:

- turpoamista tai kipua käsivarsissa tai jaloissa
- hengenhdistusta
- punoitusta tai väri-
muutoksia käsivarsissa tai jaloissa
- kipua rintakehässä tai
yläselässä
- heikotusta

- nopeaa sydämen sykettä
- silmäkipua tai silmien
turpoamista
- kasvojen puutumista
- veriyökköksiä
- päänsärkyä
- näköhäiriöitä

TÄRKEÄÄ MUISTAA: Jos sinulla on mikä tahansa maini-
tuista oireista, lopeta Hympavzin käyttö ja soita välittömästi
lääkəriille tai hakeudu päivystykseen! Nämä eivät ole kaikki
mahdollisen veritulpan oireet. Kerro lääkəriille, jos sinulla on
oireita, jotka vaivaavat sinua tai eivät mene ohi.