

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i detta patientkort. Du kan också rapportera biverkningar direkt till:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA
(webbplats: www.fimea.fi)

Eller till Pfizer Oy:
Webbplats: www.pfizersafetyreporting.com,
tel. (09) 430 040

Godkänt av Fimea: 05/2026
Version: 2.0

INFORMATION OM PATIENTEN OCH BEHANDLANDE LÄKARE

Din behandlande läkare ska fylla i sina kontaktuppgifter samt uppgifterna för patientidentifiering och information om behandling. Ha alltid med dig det här kortet och visa det för sjukvårdspersonal vid akutsituationer.



Patientens namn: _____

Datum då behandling
med Hymravzi påbörjades: _____

Namn på nödkontakt: _____

Telefonnummer till nödkontakt: _____

Läkarens namn
(som förskrivit Hymravzi): _____

Kontaktuppgifter till läkaren: _____

PATIENTKORT

HYMPAVZI (marstacimab)

Ha alltid med dig detta kort.

VISA DETTA KORT för all hälso- och
sjukvårdspersonal som är involverad i din vård
och om du uppsöker akutsjukvård.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR PATIENTER SOM BEHANDLAS MED HYMPAVZI

Hympavzi (marstacimab) är ett läkemedel som används för att förebygga eller minska blödning hos patienter som är 12 år och äldre och som väger minst 35 kg:

- med hemofili A (medfödd faktor VIII-brist)
 - som inte har utvecklat faktor VIII-inhibitorer, med svår sjukdom (faktor VIII-nivån i blodet är mindre än 1 %), eller
 - som har utvecklat faktor VIII-inhibitorer
- med hemofili B (medfödd faktor IX-brist)

- som inte har utvecklat faktor IX-inhibitorer, med svår sjukdom (faktor IX-nivån i blodet är mindre än 1 %), eller
- som har utvecklat faktor IX-inhibitorer.

Hympavzi hjälper blodet att levra sig (koagulera).

Hympavzi och läkemedel som liknar Hympavzi har konstaterats kunna orsaka blodproppar (trombos) i blodkärlen och om en blodpropp lossnar kan den förflytta sig genom blodomloppet och orsaka ett hinder i ett annat blodkärl (en så kallad tromboembolisk händelse). Beroende på lokalisering och svårighetsgrad kan tromboemboliska händelser vara livshotande eller dödliga. Risken för ventrombos (blodpropp i en ven) kan vara större under tiden före, under och efter en operation.

FÖR PATIENTEN

SLUTA använda Hympavzi och kontakta läkare omedelbart om du får symtom på en blodpropp, till exempel följande biverkningar:

- **Svullnad eller smärta i armarna eller benen**
- **Rodnad eller missfärgning på armarna eller benen**
- **Andnöd**
- **Smärta i bröstet eller övre delen av ryggen**
- **Att känna sig svimfärdig**

- **Snabba hjärtslag**
- **Domningar i ansiktet**
- **Huvudvärk**
- **Smärta eller svullnad i ögonen**
- **Problem att se**
- **Blodiga upphostningar**

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: Om du har något av dessa symtom ska du sluta använda Hympavzi och omedelbart kontakta läkare eller uppsöka akutsjukvård! Detta är inte samtliga symtom på en möjlig blodpropp. Berätta för läkaren om du har symtom som besvärar dig eller inte försvinner. Om du behöver genomgå en operation ska du berätta för hälso- och sjukvårdspersonalen att du använder Hympavzi.