

POTILASKORTTI

Potilaskortti
Viatri Limited

Rivaroxaban Viatri 2,5 mg
Rivaroxaban Viatri 10 mg
Rivaroxaban Viatri 15 mg
Rivaroxaban Viatri 20 mg

- ♦ **Pidä tämä kortti aina mukanas**
- ♦ **Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä**

Käytän verenohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban Viatri (rivaroksabaani).

Nimi
Osoite
Syntymäaika
Paino
Muut lääkkeet/sairaudet

Hätätapauksissa ilmoittakaa:

Lääkärin nimi:
Lääkärin puhelin:
Lääkärin leima:

Ilmoittakaa myös:

Nimi:
Puhelin:
Suhde potilaaseen:

Tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle:

- ♦ INR-mittausta ei tule käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban Viatri -valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti.

Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban Viatri -valmisteesta?

- ♦ Rivaroxaban Viatri ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen.
- ♦ Ota Rivaroxaban Viatri -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, **kun otat sinulle määrätty annokset säännöllisesti.**
- ♦ Älä lopeta Rivaroxaban Viatri -valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.
- ♦ Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Viatri -valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa.
- ♦ Kerro aina että käytät Rivaroxaban Viatri -valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide

Milloin tarvitsen lääkärin apua?

Rivaroxaban Viatri -valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on

verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban Viatris -valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista:

- ◆ kipua
- ◆ turvotusta tai epämukavuutta
- ◆ päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- ◆ epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan
- ◆ tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa tai muuta verenvuotoa emättimestä
- ◆ virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia
- ◆ yskit verta taikka oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia

Miten otan Rivaroxaban Viatris -valmistetta?

- ◆ Parhaan suojan saamiseksi Rivaroxaban Viatris
 - 2,5 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa
 - 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa