

82 mm ± 0,5 mm	
direction of reading PhC	
Potilaskortti	
Apixaban Krka (apiksabaani)	
Pidä tämä kortti aina mukana/Lapsen tai häntä hoitavan henkilön on pidettävä tämä kortti aina mukana. Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle, hammaslääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle ennen hoitoa. Saan verenhytytymistä estävää Apixaban Krka -hoitoa (apiksabaani) verisuonitukosten estämiseksi.	
Tietoa potilaille/hoitajille	
• Ota/anna Apixaban Krka säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat aamuannoksen, ota/anna se heti kun muistat. Se voidaan ottaa/antaa yhdessä ilta-annoksen kanssa. Unohtuneen ilta-annoksen saa ottaa/antaa vain samana iltana. Älä ota/anna seuraavana aamuna kahta annosta, vaan jatka seuraavana päivänä hoitoa suositellun tavanomaisen aikataulun mukaan kahdesti vuorokaudessa.	
• Älä lopeta Apixaban Krka -lääkkeen käyttöä/antamista keskustelematta ensin	
lääkärin kanssa, sillä potilaalla on riski saada aivohalvaus (aikuiset)/verisuonitukos (lapset) tai muita komplikaatioita.	
• Apixaban Krka auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuotoriskiä.	
• Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, verisykä tai verioksenus.	
• Jos verenvuoto ei lopu itsestään, hakeudu heti hoitoon.	
• Jos tarvitset/potilas tarvitsee leikkaushoitoa tai sinulle/hänelle pitää tehdä mikä tahansa kajoava toimenpide, kerro lääkärille, että käytät Apixaban Krka -lääkettä/kerro	
terveyspalvelujen tarjoajalle, että lapsi käyttää Apixaban Krka -lääkettä.	
MM-YYYY	
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille	
• Apixaban Krka (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyytymistekijä Xa:ta.	
• Apixaban Krka saattaa suurentaa verenvuotoriskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.	
• Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Apixaban Krka -hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja	
hätäleikkauksen yhteydessä, anti-FXa- määrityksestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiini aika (PT), international normalised ratio (INR) ja aktivoitu partiaalin tromboplastiini aika (aPTT) - katso valmisteyhteenveto.	
• Aikuksille on saatavilla apiksabaanin antifaktori Xa -aktiivisuuden kumoava aine, mutta sen turvallisuutta ja tehoa pediatriassa potilailla ei ole varmistettu (ks. andeksaneetti alfan valmisteyhteenveto).	
Versio: 1.0	



- Pantone 2144 C

stran 1./side 1.:

LAKIRANO OBMOČJE/VARNISHED AREA

stran 2./side 2.:

NELAKIRANO OBMOČJE/UNVARNISHED AREA



Šifra/Article No.: XXXXXX

Emb. mat./Article name.:

KART. Apixaban Krka FI

Dimenzije/Dimension:
208 mm x 82 ± 0,5 mm

Material: /

PhC št./PhC No.: xxxxxx

Merilo/Measure: 1:1

Datum/Date: 24.07.2025

Izdelal/Prepared by: V. Logar

Pregledal/Checked by: J. Kastelic

Oddelek za oblikovanje/Packaging Design

KART. APIXABAN Krka FI
PAC. APIXABAN Krka FI

stran 1./side 1.

MockUp026968_1

	82 mm ± 0,5 mm	
208 mm ± 0,5 mm	Ole hyvä ja täytä tämä osio itse tai pyydä lääkäriä tekemään se	
	Nimi: _____	36 mm
	Syntymäaika: _____	
	Käyttöaihe: _____	
	Paino (lapsilla): _____	36 mm
	Annos: _____ mg kahdesti vuorokaudessa	
	Lääkärin nimi: _____	

	Lääkärin puhelinnumero: _____	
		35 mm
		34 mm
		34 mm
		33 mm