

82 mm ± 0,5 mm

direction of reading PhC

Patientkort

Apixaban Krka (apixaban)

Bär med dig detta kort vid alla tillfällen/Barnet eller vårdnadshavaren ska alltid ha med sig kortet.

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdspersonal före behandling.

Jag behandlas med Apixaban Krka (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar.

XXXXXX

KRKA

Information till patienten/vårdnadshavare

- Ta eller ge Apixaban Krka regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta eller ge den så snart du kommer på det, och den kan tas eller ges tillsammans med kvälldosen. En missad kvälldos kan bara tas eller ges under samma kväll. Ta eller ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt att följa doseringsschemat två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.
- Sluta inte ta eller ge Apixaban Krka utan att rådfråga läkaren, eftersom patienten riskerar att få en stroke (vuxna)/blodpropp (barn) eller andra komplikationer.

- Apixaban Krka hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart.**
- Om du/patienten är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du använder Apixaban Krka/Informera vårdgivaren om att barnet tar Apixaban Krka.

06/2025

Information till vårdpersonal

- Apixaban Krka (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban Krka kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Apixaban Krka kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.ex vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringsstest rekommenderas ej) – se Produktresumé.

- Ett läkemedel för reversering av anti-faktor Xa-aktiviteten för apixaban finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts hos pediatrika patienter (se produktresumén för andexanet alfa).

Version: 1.0



- Pantone 2144 C

stran 1./side 1.:

LAKIRANO OBMOČJE/VARNISHED AREA

stran 2./side 2.:

NELAKIRANO OBMOČJE/UNVARNISHED AREA

Šifra/Article No.: XXXXXX
Emb. mat./Article name.: KART. Apixaban Krka SE
Dimenzije/Dimension: 208 mm x 82 ± 0,5 mm
Material: /
PhC št./PhC No.: xxxxxx
Merilo/Measure: 1:1
Datum/Date: 17.06.2025
Izdelal/Prepared by: V. Logar
Pregledal/Checked by: J. Kastelic
Oddelek za oblikovanje/Packaging Design

KART. APIXABAN Krka SE
PAC. APIXABAN Krka SE

stran 1./side 1.

MockUp026971_1

82 mm ± 0,5 mm

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be läkaren fylla i

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Indikation: _____

Vikt (för barn): _____

Dos: _____ mg två gånger dagligen

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

36 mm

36 mm

35 mm

34 mm

34 mm

33 mm

208 mm ± 0,5 mm