

CARVYKTI® (siltakabtageeniautoleuseeli) -potilaskortti

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Fimealle: [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

POTILAAN NIMI:

Yhteyshenkilö hätätilanteessa

POTILASTA HOITAVAN
HENKILÖN/ OMAISEN NIMI:

POTILASTA HOITAVAN
HENKILÖN/ OMAISEN
PUHELINNUMERO:

TAITA TÄSTÄ

**Ensisijainen CAR-T-hoidosta vastaava
terveydenhuollon ammattilainen**

TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISEN NIMI:

TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISEN
PUHELINNUMERO:

CAR-T-HOITOKESKUKSEN
OSOITE:

CAR-T-HOITOKESKUKSEN
PUHELINNUMERO:

TAITA TÄSTÄ

Tärkeää tietoa potilaalle

Pidä tämä kortti aina mukanas. Näytä se aina sinua hoitaville lääkäreille ja kun käyt sairaalassa.

Kerro kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille, että olet saanut siltakabtageeniautoleuseeli-hoitoa.

Sinun on pysyttävä sinua hoitaneen sairaalan lähiseudulla vähintään 4 viikon ajan siltakabtageeniautoleuseeli-hoidon jälkeen.

Älä aja moottoriajoneuvoa äläkä käytä työkaluja tai koneita vähintään 8 viikkoon siltakabtageeniautoleuseeli-infuusion jälkeen.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

TAITA TÄSTÄ

Jos sinulle ilmaantuu uusia oireita ja etenkin tässä kortissa lueteltuja oireita, ota heti yhteyttä lääkäriin, sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen tai kehen tahansa muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen.

Siltakabtageeniautoleuseeli voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia eri puolilla elimistöä. Nämä oireet voivat olla henkeä uhkaavia tai jopa johtaa kuolemaan, joten ne on hoidettava heti.

Lieviltä vaikuttavat oireet voivat pahentua nopeasti. Oireet voivat olla viivästyneitä ja ilmetä vasta viikkoja infuusion jälkeen.

Soita heti sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista:

Sytokiinioireyhtymä

Kuume (38 °C tai korkeampi)
Vilunväristykset
Nopea sydämen syke
Hengitysvaikeudet
Huimaus tai pyörrytys

Neurologinen toksisuus

Sekavuuden tunne
Heikentynyt vireystila, ajan ja paikan tajun häviäminen (desorientaatio), ahdistuneisuus tai muistamattomuus
Puheen vaikeus tai puheen puuroutuminen
Hitaat liikkeet tai käsialan muutokset

TAITA TÄSTÄ

Hoitotiimi täyttää

Anna tämä kortti CAR-T-hoitotiimille, joka täyttää kortin ja antaa sen sitten sinulle takaisin.

(PVM.)

tämä potilas on saanut siltakabtageeniautoleuseeli-valmistetta, joka on kimeeristä antigeenireseptoria ilmentäviä T-soluja sisältävä valmiste (CAR-T-hoito) multipppelin myelooman hoitoon.

(ERÄNUMERO)

TAITA TÄSTÄ

Tärkeitä tietoja terveydenhuollon ammattilaisille

Tämä potilas on saanut muokattuja autologisia T-soluja sisältävää immuunihoitovalmistetta, josta voi aiheutua vaikea-asteinen ja jopa kuolemaan johtava sytokiinioireyhtymä ja neurologista toksisuutta. Sytokiinioireyhtymä voi vaikuttaa mihin tahansa elinjärjestelmään. Tutki potilaalta sytokiinioireyhtymän ja neurologisen toksisuuden oireet ja löydökset.

Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta.

TAITA TÄSTÄ

Ota ennen hoidon aloittamista yhteyttä ensisijaiseen potilaan hoidosta vastaavaan terveydenhuollon ammattilaiseen, jonka puhelinnumero on kortin etupuolella. Potilas ei saa luovuttaa verta, elimiä, kudoksia eikä soluja.

Paikallinen edustaja:
Janssen-Cilag Oy
Puh: + 358 207 531 300
jacfi@its.jnj.com