

TEPEZZA (teprotumumabi)

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA ([www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.sivusto: www.fimea.fi)).

Potilasopas: Tietoa kuulo-ongelmien riskistä ja syntymättö- mään lapseen kohdis- tuvien haittojen riskistä

Tässä oppaassa kerrotaan Tepezza-hoitoon liittyvistä kuulo-ongelmien ja syntymättömään lapseen mahdollisesti kohdistuvien haittojen riskeistä. Säilytä tämä opas, jotta voit palata siihen hoidon aikana tai sen jälkeen.

Tämän oppaan tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan keskustelua lääkärin tai muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Lue pakkausseloste saadaksesi täydelliset tiedot Tepezzan mahdollisista haittavaikutuksista. Jos sinulla on kysyttävää Tepezzasta, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa tai tutustu pakkausselosteeseen verkkosivulla Laaakeinfo.fi. Pakkausselosteen lisäkopioita voi pyytää Amgenin lääketietoasiantuntijalta puh. (09) 54 900 500, sähköposti medinfo.finland@amgen.com.

Tärkeää turvallisuustietoa

Kuulo-ongelmat

Tepezza-hoito voi aiheuttaa kuulo-ongelmia, ja joissakin tapauksissa ne eivät välttämättä korjaannu. Jos sinulla on jo ennestään kuulo-ongelmia, ne voivat pahentua hoidon aikana tai hoidon päättymisen jälkeen.

Kerro terveydenhuollon ammattilaiselle kaikista käyttämästäsi lääkkeistä, myös ilman reseptiä saatavista valmisteista ja rohdosvalmisteista.

Jos aloitat uuden lääkkeen Tepezza-hoidon aikana, muista kertoa siitä terveydenhuollon ammattilaiselle välittömästi.

Ennen Tepezza-hoidon aloittamista

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos:

- ☐ sinulla on ollut kuulo-ongelmia tai käytät kuulolaitetta
- ☐ olet herkkä koville äänille
- ☐ sinulla on diabetes tai esidiabetes
- ☐ tupakoit
- ☐ sinulla on aiemmin esiintynyt korkeaa verenpainetta

Sinun pitää lopettaa tupakointi ennen Tepezza-hoidon aloittamista. Lääkärin on ehkä seurattava verenpainettasi ennen hoitoa ja hoidon aikana.

Kuulo-ongelmien merkit

Kiinnitä huomiota seuraaviin oireisiin:

*osittainen
tai täydellinen
kuulon
menetys*

*korvien
soiminen tai
surina*

*tunne, että
korvat ovat
lukossa tai
niissä on
painetta*

*oman äänen
kuuluminen
tavallista
kovempaa*

*äänten
kuulostaminen
vaimeilta tai
epäselviltä*

Jos huomaat jonkin näistä oireista, kerro siitä lääkärille heti.

Tepezza-hoidon aikana pitää välttää kovaa melua.

Kuulontutkimukset

Lääkäri tarkistaa kuulosi seuraavissa vaiheissa:

- ☐ ennen Tepezza-hoidon aloittamista
- ☐ hoidon aikana
- ☐ hoidon päätyttyä

Jos sinulle ilmaantuu kuulo-ongelmia hoidon aikana, lääkäri voi suositella lisäkuulontutkimuksia, jotta tilannettasi voidaan seurata.

Hoidon jälkeinen seuranta

Lääkäri seuraa kuuloasi 6 kuukauden ajan Tepezza-hoidon päättymisen jälkeen.

Hoidon lopettaminen

Lääkäri voi lopettaa Tepezza-hoidon, jos sinulle ilmaantuu kuulo-ongelmia, jotka:

- ☐ vaativat lääkärinhoitoa
- ☐ vaikeuttavat päivittäisistä toimista suoriutumista
- ☐ pahenevat edelleen

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

Tärkeää turvallisuustietoa

(Jatkuu)



Syntymättömään lapseen kohdistuvien haittojen ehkäisy

Tepezza ja raskaus

- ☐ ÄLÄ käytä Tepezzaa, jos olet raskaana.
- ☐ Tepezza voi vahingoittaa syntymätöntä lasta.
- ☐ Jos epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista.
- ☐ Kerro hoitavalle lääkärille heti, jos tulet raskaaksi Tepezza-hoidon aikana.

Raskaudenehkäisy Tepezza-hoidon aikana

Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä:

- ☐ Tepezza-hoidon aikana
- ☐ vähintään 6 kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen

Keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä ehkäisymenetelmä sopii sinulle parhaiten.