

Tärkeitä yhteystietoja

Erikoislääkärin nimi

Puhelinnumero

Puhelinnumero virka-ajan ulkopuolella

Oma nimi

Oma puhelinnumero

Yhteyshenkilö hätätilanteessa

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Suorajakelijan riskienminimointimateriaalin
hyväksymispäivämäärä 9.2.2023.

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.

Potilaskortti

JEMPERLI (dostarlimabi)

**Tärkeää turvallisuustietoa immuunivälitteisten
haittavaikutusten riskin pienentämiseksi**

JEMPERLI voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka voivat joskus olla vakavia tai henkeä uhkaavia ja johtaa kuolemaan. Haittavaikutuksia voi esiintyä milloin tahansa hoidon aikana tai hoidon jälkeen. Haittavaikutuksia voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kehon alueella samanaikaisesti.

Ota välittömästi yhteyttä erikoislääkäriisi, jos sinulla esiintyy jokin tässä kortissa luetelluista oireista, jokin muu oire tai jos oireet pahenevat. **Välitön lääkärihoito voi estää ongelman kehittymisen vakavammaksi.** Lääkärisi saattaa määrätä sinulle oireiden hoitoon muita lääkkeitä, siirtää seuraavaa JEMPERLI-annosta tai lopettaa hoidon.

Lisätietoja, ks. pakkausseloste.

TÄRKEÄÄ TIETOA

- Älä yritä diagnosoida tai hoitaa haittavaikutuksia itse.
- **Pidä tämä kortti aina mukana**, myös matkoilla, mennessäsi päivystykseen tai käydessäsi toisella lääkäriillä.
- Säilytä tämä kortti vähintään 4 kuukauden ajan viimeisen JEMPERLI-annoksen jälkeen.
- Kerro kaikille sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille, että saat JEMPERLI-hoitoa, ja näytä heille tämä kortti.

Ota yhteyttä onkologian hoitotiimiisi, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista merkeistä tai oireista, muita merkkejä tai oireita tai jos oireet pahenevat.

Keuhkot

- Hengenahdistus
- Rintakipu
- Yskä

Suolisto

- Ripuli (löysät ulosteet tihein väliajoin)
- Mustat, tervamaiset, tahmaiset ulosteet
- Veri tai lima ulosteessa
- Vaikea vatsan alueen kipu tai aristus

Maksa

- Vaikea pahoinvointi tai oksentelu
- Ruokahaluttomuus
- Oikeanpuoleinen vatsakipu
- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus
- Virtsan tummuus (virtsa teen väristä)
- Verenvuoto- tai mustelma-alttius

Iho

- Ihottuma, kutina, ihon kesiminen tai rakkulamuodostus
- Suun, nenän, nielun tai sukuelinten alueen rakkulat tai haavaumat

Munuaiset

- Virtsan määrän väheneminen
- Nilkkojen turvotus
- Verivirtsaisuus

Umpieritys

- Nopea sydämen syke
- Painonlasku tai painonnousu
- Näön muutokset
- Lisääntynyt hikoilu
- Hiustenlähtö
- Kylmän tunne
- Voimakas väsymys
- Ruokahalun tai janon lisääntyminen
- Tiheävirtsaisuus
- Ummetus
- Äänen madaltuminen
- Huimaus tai pyörtyminen
- Pitkittynyt tai poikkeava päänsärky

Muut

- Vaikea tai pitkittynyt lihaskipu tai -heikkous
- Sekavuus tai muistihäiriöt
- Kouristuskohtaukset
- Kuume tai flunssan kaltaiset oireet
- Mielialan tai käyttäytymisen muutokset
- Ylä- tai alaraajojen kihelmöinti tai puutuminen
- Epäsäännöllinen sydämensyke

JEMPERLI saattaa aiheuttaa muitakin haittavaikutuksia. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkauselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Tärkeää tietoa terveydenhoidon ammattilaisille

Tämä potilas saa JEMPERLI-hoitoa, joka voi aiheuttaa immuunivälitteisiä haittavaikutuksia milloin tahansa hoidon aikana tai hoidon jälkeen. Niitä voi esiintyä missä tahansa elimessä tai kudoksessa ja useammassa elinjärjestelmässä samanaikaisesti. Arvioi, onko potilaalla immuunivälitteisten haittavaikutusten merkkejä tai oireita (joko tässä kortissa lueteltuja tai muita). Varhainen diagnosointi ja asianmukainen hoito ovat välttämättömiä, jotta voidaan minimoida immuunivälitteisten haittavaikutusten seuraukset.

Epäillyt immuunivälitteiset haittavaikutukset on tutkittava asianmukaisesti etiologian varmistamiseksi ja muiden syiden poissulkemiseksi. Haittavaikutuksen vaikeusasteen perusteella JEMPERLI-hoito on keskeytettävä tai lopetettava pysyvästi ja potilaalle on annettava kortikosteroideja tai muuta asianmukaista hoitoa.

Tarkempia ohjeita immuunivälitteisten haittavaikutusten hoitoon, ks. suoratuojan JEMPERLI-valmisteyhteenvedo.

Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoidossa voi olla hyödyllistä konsultoida onkologia tai muuta erikoislääkäriä.

Lisätietoja, ks. suoratuojan valmisteyhteenvedo.